

# Using Fentanyl?

Here are some tips from people who use fentanyl on how to stay safe and prevent overdose!

Fentanyl is a very strong synthetic opioid. It's often described as 80 - 100 times stronger than morphine and 60 times stronger than heroin, but like any street drug, how strong something is also depends on your tolerance and the cut you're purchasing.


**The same harm reduction practices that decrease your overdose risk when using heroin, other opioids, and other drugs will work for fentanyl and its analogues, too!**

**Narcan/naloxone works on fentanyl overdoses, but you should act fast. As soon as someone stops breathing, administer Narcan and start rescue breathing. One dose every two minutes, combined with rescuing breathing, will work!**



Using alone means there's nobody there to respond if you go out, so make sure to be extra careful and double down on your other safety strategies when using alone, or have someone check on you!

Know the signs of an overdose and carry Narcan, no matter what drug you're using. If using in a group, make sure at least one person stays alert and has Narcan.



Fentanyl acts fast, so using **slowly** allows your body to adjust and gives you time to understand how it will hit you. Be mindful that the initial high can feel very intense, followed feeling more lucid—that doesn't mean the fentanyl has left your system, so "re-dosing" right away could lead to an overdose.

Because fentanyl is so strong, the margin of error is much smaller when it comes to overdose. Using less to start can help you gauge an appropriate dose for you!

Test your drugs so you can make the most educated decisions possible.

Try snorting or smoking instead of injecting. Injecting carries the highest risk for overdose, so shifting to snorting or smoking may help reduce risk. You can still overdose by smoking/snorting, especially with fentanyl, so start slow/use less to start!



# ¿Consume fentanilo?

A continuación, le ofrecemos algunos consejos de personas que consumen fentanilo sobre cómo mantenerse seguro y evitar una sobredosis.

El fentanilo es un potente opioide sintético. Con frecuencia, se dice que es entre 80 y 100 veces más potente que la morfina, y 60 veces más potente con la heroína, pero, al igual que las drogas ilegales, esto depende de la tolerancia que usted tenga y de la pieza de la droga que adquiera.


**Las mismas prácticas de reducción de los riesgos que se usan para disminuir el riesgo de sobredosis de heroína, otros opioides u otras drogas también funcionarán para el fentanilo y sus análogos.**

**Puede usar Narcan (naloxona) para las sobredosis de fentanilo, pero debe actuar rápidamente. Al instante que la persona deje de respirar, adminístrele Narcan y comience la respiración de rescate. Con una dosis cada dos inuros, combinada con la respiración de rescate, logrará reanimar a la persona.**



Si consume drogas solo, no habrá nadie para socorrerlo si pierde el conocimiento. Por lo tanto, debe ser más cuidadoso y extremar sus otras estrategias de seguridad en esos casos, o pedirle a alguien que lo controle.

Conozca las señales de sobredosis y siempre lleve Narcan, no importa qué droga consuma. Si consume en grupo, asegúrese de que una persona esté alerta y tenga Narcan.



El fentanilo actúa rápido, por lo que consumirlo lentamente le permite al cuerpo adaptarse y le da tiempo a usted para que perciba cómo la afectará. Tenga en cuenta que el primer efecto puede ser muy intenso, seguido de un período más lúcido, lo cual no significa que es el fentanilo haya dejado el organismo; por eso, tomar otra dosis enseguida podría provocar una sobredosis.

Dado que el fentanilo es tan potente, el margen de error en el caso de una sobredosis es mucho menor. Consumir menos en un principio puede ayudarlo a encontrar la dosis adecuada.

Hacer una prueba de sus drogas para poder tomar una decisión informada.

Pruebe aspirar o fumar en lugar de inyectarse. Inyectarse implica el mayor riesgo de sobredosis; por eso, aspirar o fumar puede ayudar a reducir ese riesgo. También es posible que tenga una sobredosis por aspirar o fumar, especialmente con fentanilo, por lo que debería comenzar lentamente o consumir menos al principio.

